



物理治疗部门

腰椎术后护理 (住院期间)

患者信息

手术后可以预料什么

1. 疼痛：动完手术后感到疼痛是正常的。记得按时服用止痛药，或利用病人自控止痛器来止痛。
2. 物理治疗：在医生的指示下，您将会开始接受物理治疗。治疗师会协助您下床及做短距离的行走。
3. 颈圈 或 颈托：手术后，您有可能需要在医生的指示下穿上腰托或腰围。穿着时期是 _____ 个星期/月；请务必按照医生的指示。
4. 物理治疗门诊：医生或治疗师会帮您安排
 - € 2 – 4 个星期之内，或者
 - € 6 个星期后




个人目标

我要在 _____ 的期间 能 _____。

术后立即的护理


1. 休息姿势:

- a) 平躺在床上: 床面应该是平的, 或一点倾斜。将枕头放在膝盖的后面可以使自己更舒适。
- b) 侧躺: 将枕头放在膝盖之间。保持膝盖弯曲, 确保背部是直的。



3. 上床睡觉:

使用以上的步骤, 以相反的顺序执行。坐在床沿, 慢慢将上半身侧边躺下, 同时将双脚抬上床。



4. 走路 / 坐在椅子上:

在医生允许的范围内, 尽早活动能减少手术后的许多并发症, 以及增进复原。

运动


€ 深呼吸活动

用鼻子吸气，感觉下胸部向外扩展。憋气3秒，再用嘴巴把气呼出来。每1小时做10次。




€ 脚踝运动

将脚板上下移动。每1小时做10次。



€ 膝盖弯曲活动

轻轻把1只脚弯曲再伸直。每1小时做10次。



€ 膝盖往胸部的伸展运动

在能容忍的范围内，轻轻把膝盖往胸前弯曲，维持10秒。重复3至5次。



€ 抬腿运动

将一只脚弯曲，并慢慢将另一只腿抬高，离床6至10英寸。重复5至10次。请不要拱背。



€ 抬脚跟运动

站立，双手支撑在稳定的表面上。保持背部伸直，同时将双脚的脚跟轻轻抬起。重复5至10次。



您按照物理治疗师的指示进行这些运动。

手术后建议

以下是大致上的说明，与您的情况可能会有所不同。若您有任何问题，请询问您的医生或物理治疗师。

动作	一般建议
弯曲或扭曲背部、提重物	手术后的4至6个星期之内，请勿弯曲或扭曲背部。请勿提超过3公斤的物品；提物品时，请把物品靠近身体。
坐	先从20分钟开始，慢慢地增加坐着的时间。建议您时常转换姿势（每30至40分钟）。
行走	先从短距离开始，再慢慢地增加行走距离、走出户外。以下是大致上的指南： 0至2个星期：5到10分钟，每天3到5次（仅在能容忍的程度之内）。 3至4个星期：10到20分钟，每天3到5次（仅在能容忍的程度之内）。
骑脚车	动手术的2个星期之后，您可以先在健身脚踏车上开始练10分钟。 慢慢增加练习时间。 如果病状有所增加，请马上停止练习。
驾车	0至2个星期：禁止驾车 2至4个星期：能开始短距离的架势 *回复驾驶前，请先向医生查询。
返回工作 (行政工作)	通常在2至4个星期后可以返回工作。 请避免长时间坐着，尽量保持30至45分钟之间（请时常站起来走动）。
返回工作 (劳力工作)	通常在8至12个星期后可以返回工作。这可能因您的工作性质而异，请向医生查询。
返回运动	您的医生或物理治疗师会根据您的运动类型做出复健的规划。

什么情况要关注？

如果您有以下的症状，请马上通知医生：

- 大小便失禁的征兆
- 手或腿部的力量严重降低
- 持续的发烧
- 伤口渗血或流血