

总结

- 每天服药一次。
- 定期验血。
- 留意任何可能出现的副作用和过敏反应，以及应当何时立即求医。
- 马西替坦会与其它药物产生相互反应。请把自己正在服用或打算服用的所有药物包括非处方药或中成药告诉医生或药剂师。
- 不要在未通知医生、资深临床护士或药剂师的情况下服用非处方药物、补充剂、替代药品、传统草药或中成药。
- 如果您有计划生育，进行药物治疗前，请先向医生咨询。
- 若有任何疑问，请拨打6576 2418与您的医生或资深临床护士洽谈，或拨打6326 5077向药剂师询问。

联合撰写
药剂部门
风湿病与免疫学部门



新加坡中央医院
欧南路
邮区169608
www.sgh.com.sg

注册商号：198703907Z
信息截至2016年8月均为正确无误。

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®

印刷资助商



药物须知

马西替坦 (Macitentan)



功能与用途

- 马西替坦（**macitentan**）是用于治疗某种类型肺动脉高血压（PAH）的药物。肺动脉高血压是一种致命性的慢性疾病，主要是因为肺动脉血管收缩阻塞，造成血脉缺氧。
- 此药可以降低肺动脉血压，延缓病情的进展。

服用方法

- 新加坡中央医院只使用10微克的马西替坦剂片。
- 每天饭前或饭后口服1次。
- 用白开水吞服片剂，不要将它压碎或嚼碎。
- 此药可以单独服用也可以与其它降肺动脉高血压的处方药一起服用。

忘记服药怎么办

- 如果错过了服药时间，请记得尽快补服。
- 如果太接近下一个服药时间，就不必补服，继续按照原定时间服药。
- 请不要同时服用两次的剂量来进行弥补。

暂停服药情况

- 医生会根据病人的个人情况来决定是否应该停止服药。

副作用和过敏反应

- 常见的副作用有：
 - 鼻塞、伤风。
 - 喉咙痛。
 - 呼吸道敏感。
 - 头痛。
 - 贫血。
 - 尿道发炎。
- 不常见的副作用有：
 - 过敏反应症状包括皮疹、瘙痒、嘴唇、舌头、脸部或咽喉肿胀。
 - 肝损伤症状，例如恶心、呕吐、发烧、腹痛或异常疲倦。
 - 出现黄疸症状（眼白或皮肤变黄）。
- 严重的副作用有：
 - 胎儿严重先天性缺陷。
 - 贫血（红血球低）。
 - 肝脏问题。

何时立即求医

- 如果发生以下状况，请及时通知医生或药剂师。
 - 服用超过处方的剂量。
 - 发现任何严重的副作用或这册子里没有提到的其它不良反应。

服药时所需注意的事项

- 请按照医生的指示定期验血以免治疗期间发生任何不良的药物反应，因为有些副作用是无症状的，例如肝功能异常和贫血。
- 如果你有贫血或肝脏疾病，请通知医生。
- 建议适龄生育的女性患者每月做一次妊娠检验以确保在治疗期间没有怀孕。

其它药物与补充剂

- 马西替坦会与其它药物产生相互反应，减少马西替坦的药效或引起副作用。
- 请把自己正在服用或打算服用的所有药物包括非处方药物或补充剂告诉医生或药剂师。
- 不要在未通知医生或药剂师的情况下服用任何补充剂、替代药品、传统草药或中成药。

药物与生育

- 马西替坦会造成严重的胎儿先天性缺陷，所以适龄生育的男女都必须采取可靠的避孕措施以避免在治疗期间怀孕。
- 如果您有计划生育，进行药物治疗前，请先向医生咨询。
- 目前没有文献证实此药是否会排入母乳，对婴儿造成伤害或影响。为安全起见，不建议哺乳中的母亲服用此药。

储存建议

- 把药储存在30°C以下的地方。
- 别把药物放在孩童触手可及的地方。