

药物须知

柳氮磺胺吡啶

(Sulphasalazine)



Singapore
General Hospital
SingHealth

以下信息是仅为使用柳氮磺胺吡啶(每日不超过3克剂量)的患者所提供。

功能与用途

- 柳氮磺胺吡啶(sulphasalazine)是属于一组称为氨基水杨酸的药物，用来减轻由关节炎引起的疼痛和肿胀，例如类风湿关节炎。
- 它是抗风湿药物的其中一种。可以减少长期发炎所致的永久关节损伤和减缓病情发展进度。
- 可以与其它抗风湿药物或生物制剂一起使用来控制疾病。

服用方法

- 每天剂量是500毫克至3克。剂量因人而异并根据其他因素而定，例如病情活跃程度和对治疗的反应。
- 每天服用1至3次，饭后口服以避免肠胃不适。
- 用水吞服片剂，不要将它压碎或嚼碎。

多久后能见效

- 一般服用1至3个月才能见效。

服药时所需注意的事项

- 请按照医生的指示定期验血以免治疗期间发生任何不良的药物反应，因为有些副作用是无症状的。
- 记得使用防晒品以及避免长时间在太阳底下曝晒，因为此药会令皮肤对阳光敏感。
- 避免到人多的地方。

忘记服药怎么办

- 如果错过了服药时间，请记得尽快补服。
- 如果太接近下一个服药时间，就不必补服，继续按照原定时间服药。
- 请不要同时服用两次的剂量来进行弥补。

副作用和过敏反应

- 服用后一般不会产生太多的副作用，但还是应该留意可能出现的过敏反应。
- 柳氯磺胺吡啶可能会导致尿液变橙色。如果你有佩戴隐形眼镜，镜片也可能被沾染。所以不要为这些症状感到惊慌。
- 常见的副作用有：
 - 恶心、呕吐。
 - 食欲不振。
 - 头晕、头痛。
- 罕见的副作用有：
 - 过敏症状。
 - 肝炎。
 - 心脏壁膜血管和肌肉血管发炎。
 - 血球数量下降。
 - 耳鸣。
 - 影响睡眠。
 - 抑郁症和幻觉。

如果发现任何严重的副作用或这册子里没有提到的不良反应，请通知您的医生或药剂师。

何时立即求医

- 如果发生以下症状，请尽快求医。
 - 过敏反应症状，例如皮疹、荨麻疹、瘙痒、红肿、水泡或脱皮症状、喘息、喉咙或胸闷、呼吸或说话困难、声音异常嘶哑、口腔、脸、嘴唇、舌头或喉咙肿胀。
 - 发烧超过38°C或其它感染症状，例如寒战、咳嗽或排尿涩痛。
 - 感觉非常疲倦或虚弱。
 - 粪便中有药物残留。
 - 服药后仍然腹泻和/或呕吐不止。
 - 严重的皮肤发炎。
 - 出现黄疸症状（眼白或皮肤变黄）。
 - 呼吸困难。

其它药物与补充剂

- 柳氮磺胺吡啶不是止痛药，医生可能会给你一些能缓解疼痛的药物。
- 服用此药后的2小时内，不要服用铁质补充剂。
- 如果要服用非处方药物，请先向医生或药剂师咨询。
- 不要在没有通知医生或药剂师的情况下服用任何补充剂、替代药品、传统草药或中成药。

饮食禁忌

- 除非医生另有指示，否则每天饮用2至3公升的液体，确保身体水分充足。
- 多吃营养丰富的食物（建议少量多餐）。
- 避免/不要喝酒或根据医生建议的喝酒量以及次数，因为酒精会增加肝损伤的风险。
- 禁止吃生的或尚未煮熟的食物。

药物与生育

- 柳氮磺胺吡啶对胎儿成长和发育应该是安全的。不过进行药物治疗前还是先向医生咨询。
- 此药会减少精子数量和降低其活跃度。不过这些现象会在停止服药后的2个月内恢复正常。如果您有计划生育，请通知医生或药剂师。

储存建议

- 别把药物放在高温、潮湿、有阳光直射或孩童触手可及的地方。
- 别把药物直接丢进废水或垃圾里。请向药剂师询问正确的处理方法。这些措施将能帮助保护环境。

总结

- 除非医生另有指示，否则每天按时服药。
- 定期验血。
- 留意任何可能出现的副作用和过敏反应，以及应当何时立即求医。
- 不要在没有通知医生、资深临床护士或药剂师的情况下服用非处方药物、补充剂、替代药品、传统草药或中成药。
- 如果您有计划生育，进行药物治疗前，请先向医生咨询。
- 若有任何疑问，请拨打**6576 2418**与您的医生或资深临床护士洽谈，或拨打**6326 5077**向药剂师询问。

联合撰写
药剂部门
风湿病与免疫学部门

印刷资助商




新加坡中央医院
欧南路
邮区 169608
www.sgh.com.sg

注册商号: 198703907Z
信息截至2016年7月均为正确无误。

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®