

## 总结

- 除非医生另有指示，否则每天按时服药。
- 定期验血。
- 留意任何可能出现的副作用和过敏反应，以及应当何时立即求医。
- 不要在未通知医生、资深临床护士或药剂师的情况下服用非处方药物、补充剂、替代药品、传统草药或中成药。
- 如果您有计划生育，进行药物治疗前，请先向医生咨询。
- 若有任何疑问，请拨打6576 2418与您的医生或资深临床护士洽谈，或拨打6326 5077向药剂师询问。

联合撰写  
药剂部门  
风湿病与免疫学部门



新加坡中央医院  
欧南路  
邮区 169608  
[www.sgh.com.sg](http://www.sgh.com.sg)

注册商号: 198703907Z  
信息截至2016年7月均为正确无误。

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®

印刷资助商



## 药物须知 丙磺舒 (Probenecid)



## 功能与用途

- 丙磺舒 (probenecid)有助于促进尿酸从尿液中排出体外。
- 降低尿酸水平。

## 服药前所需注意的事项

- 如果你有葡萄糖六磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症，请通知医生。因为你可能不适合服用丙磺舒。
- 此药可能会提高尿道结石的形成，如果您曾患有肾结石，请通知您的医生。

## 服用方法

- 医生通常会从低剂量开始，然后根据治疗需要调整剂量。
- 丙磺舒需要靠尿液排出尿酸。除非医生限制你的饮水量，否则每天喝**8至9**杯水。
- 饭时或饭后服用丙磺舒可以避免感到恶心或呕吐。

## 多久后能见效

- 一般服用几个月便能见效。

## 忘记服药怎么办

- 如果错过了服药时间，请记得尽快补服。
- 如果太接近下一个服药时间，就不必补服，继续按照原定时间服药。
- 请不要同时服用两次的剂量来进行弥补。

## 副作用和过敏反应

- 药物一般耐受性良好。最常见的副作用有：
  - 食欲不振。
  - 头痛。
  - 恶心、呕吐。

## 何时立即求医

- 丙磺舒可能会产生罕见且严重的副作用。如果发生以下症状，请立即求医。
  - 喘息或呼吸困难。
  - 眼睛周围或眼皮肿胀。
  - 皮疹、严重瘙痒或荨麻疹。
  - 发烧或喉咙痛。
  - 排尿带血或涩痛。
  - 感觉疲倦或虚弱。

## 其它药物与补充剂

- 医生可能会在治疗初期开一些药来消炎、止痛和预防痛风发作。
- 如果要服用非处方药物，请先向医生或药剂师咨询。
- 不要在**没有通知医生或药剂师的情况下**服用任何补充剂、替代药品、传统草药或中成药。

## 饮食禁忌

- 除非医生另有指示，否则每天饮用**2至3**公升的液体，确保身体水分充足。

## 药物与生育

- 如果您有计划生育、正在怀孕或哺乳，进行药物治疗前，请先向医生咨询。

## 储存建议

- 别把药物放在高温、潮湿、有阳光直射或孩童触手可及的地方。